赛拉菌素滴剂说明书

宠物用 外用药

【兽药名称】

通用名称：赛拉菌素滴剂

商品名称：赛乐滴

英文名称：Selamectin Spot-on Solution

汉语拼音：Sailajunisu Diji

【主要成分】赛拉菌素

【性　　状】本品为无色至黄色液体。

【药理作用】

药效学　阿维菌素类药物外用给予后，赛拉菌素通过干扰中枢谷氨酸介导的氯离子通道使虫体发生快速、致死性和非痉挛性的神经肌肉麻痹，对体内（线虫）和体外（节肢昆虫）寄生虫均有杀灭活性。赛拉菌素可以杀灭跳蚤成虫、幼虫及跳蚤卵，因此，赛拉菌素可以通过杀灭成虫（动物身上）防止跳蚤卵孵化（动物身上和环境中）和杀灭跳蚤幼虫（仅环境中）有效中断跳蚤的生活周期。使用赛拉菌素滴剂至少每隔一月一次的皮肤碎屑可以杀灭未接触过赛拉菌素的跳蚤卵和幼虫，这样有利于控制动物所处环境中跳蚤的侵染。本品对犬心丝虫的幼虫具有杀灭作用。

药动学　在犬、猫经皮肤给药后，一部分药物经皮肤吸收进入血液，一部分药物在动物梳理被毛时经口进入消化道和血液。药物动力学研究表明，局部外用的赛拉菌素表现为持续吸收。赛拉菌素可在皮肤（尤其是皮脂腺）蓄积，保证在较长时间内皮毛上有足够的药物浓度去杀灭寄生虫，用药后30日收集的动物皮肤碎屑仍可杀灭蚤卵及其幼虫。

【适　应　证】

犬：用于治疗和预防跳蚤（栉首蚤属）感染；预防心丝虫病；治疗虱（啮毛虱）、螨（耳螨、疥螨）和成熟蛔虫（犬弓首蛔虫）感染。

猫：用于治疗和预防跳蚤（猫栉首蚤）感染；预防心丝虫病；治疗虱（啮毛虱）、螨（耳螨、疥螨）和成熟蛔虫（猫弓首蛔虫）、成熟肠钩虫（管形钩虫）感染。

【用法与用量】以赛拉菌素计。外用：一次量，每1kg体重，犬、猫6mg，每月一次。

犬/猫跳蚤感染：在整个跳蚤发病季节每月给药一次，第一次给药的时间在跳蚤活跃之前。

犬/猫心丝虫病：可以全年给药，或者至少在动物首次与蚊子接触后一个月内给药，随后每个月给药一次，直到蚊虫季节结束。最后一次给药必须在最后与蚊子接触后一个月内给药。

犬/猫蛔虫感染、虱感染：仅用一次。

猫钩虫感染、耳螨：仅用一次。

犬疥螨感染：为完全清除疥螨，连用两次。

犬耳螨：使用一次后，兽医检查评估后决定是否使用第二次。

使用时，用力向下按压管盖，刺透药管的密封处，移走管盖，给动物用药。将动物颈背后肩胛骨部的毛发分开，暴露皮肤；使药管的尖端直接接触动物皮肤，挤压药管将整管药液挤到一处皮肤上，不需按摩用药部位，勿用于破损皮肤。按表1和表2所示剂量使用。

表1　猫的赛拉菌素滴剂用法用量表

体重 (kg)	每管药量	药物浓度 (mg/ml)	使用量 (选用包装规格-ml)
≤2.5	15mg	60	0.25
2.6~7.5	45mg	60	0.75
>7.5	选择合适的2管或2管以上药液合用		

表2　犬的赛拉菌素滴剂用法用量表

体重 (kg)	每管药量	药物浓度 (mg/ml)	使用量 (选用包装规格-ml)
≤2.5	15mg	60	0.25
2.6~5.0	30mg	120	0.25
5.1~10.0	60mg	120	0.5
10.1~20.0	120mg	120	1.0
20.1~40.0	240mg	120	2.0
>40	选择合适的2管或2管以上药液合用		

【不良反应】

1.临床研究表明有1%左右的猫在用药部位或周围出现发皮屑或非类似脱屑时脱毛，极少数犬的给药部位会出现短暂的局部刺激症状，脱毛和局部刺激均可正常恢复，必要时进行对症治疗。

2.少数犬/猫用药后，用药部位可能出现局部毛发失泽和/或少量白色粉末，这是类似使用化妆品的正常现象，一般在给药后24小时消失，并且不影响本品的安全性和疗效。

3.临床试验中，极少数（≤0.5%）犬/猫出现厌食、呕吐、流涎、腹泻、嗜睡、呼吸急促和肌肉震颤。与大环内酯类药物一样，极少数犬猫会出现包括癫痫在内的可逆的神经系统症状。

4.心丝虫病患犬使用3倍剂量的赛拉菌素滴剂未观察到过敏反应，未进行更高剂量的研究。

【注意事项】

1.本品仅用于犬猫，不得用于6周龄以下的犬和8周龄以下的猫。

2.不得用于患癫痫的犬猫、犬崽、或者冠良德勇直环虫过敏的犬猫。

3.犬/猫进行后续治疗时，每个月给药时间不要超过或间隔太短，前后两次给药间隔低于跳蚤孵化周期的时间，以确保杀灭跳蚤感染。

4.当宠物主人发现未就医的宠物犬猫出现跳蚤感染时，可以在第一天给药后，在第7天再给药一次，之后连续两个月每隔一个月给药一次，这样将尽可能降低犬心丝虫发育成熟的机会。预防犬心丝虫感染时，如果更换另一种兽药产品，必须在前一种药物给药后一个月内给药。

5.治疗耳螨时，应将外耳道内松散的碎屑去掉，治疗30日后经兽医检查，经兽医诊断后决定是否进行第二次治疗。

6.为了获得最好的用药效果，请勿在宠物毛发尚湿的时候使用本品，但在用药24小时后给宠物洗澡及使用香波不会降低本品的药效。

7.治疗耳螨时，不能将药液直接滴于耳道。

8.用药后尽量避免犬猫舔舐用药部位，如果发生大量舔舐，部分猫会在短时间内会出现大量流涎现象。

9.临床研究表明，本品可安全用于经常使用如下兽用产品的动物身上：如疫苗、驱虫药、抗寄生虫药、抗生素、类固醇、颈圈、洗发香波和药浴等。

10.不得用于人，如果人直接触及。

11.本品可能对皮肤和眼睛有刺激性，用后洗手。如不慎皮肤接触药物，应立即用肥皂和清水冲洗；如溅入眼内，用大量水冲洗；如不慎食入，应立即就医。

12.本品易燃，要远离热源、火源。

【休药期】未制定。

【规　　格】(1) 0.25ml:15mg　(2) 0.75ml:45mg　(3) 0.25ml:30mg
(4) 0.5ml:60mg　(5) 1.0ml:120mg　(6) 2.0ml:240mg

【包　　装】(1) 1管/盒　(2) 3管/盒　(3) 6管/盒

【贮　　藏】遮光、密闭、在30°C以下保存。

【有 效 期】36个月。

【批准文号】(1) 0.25ml:15mg：兽药字110803395
(2) 0.75ml：45mg：兽药字110803396
(3) 0.25ml：30mg：兽药字110803397
(4) 0.5ml：60mg：兽药字110803398
(5) 1.0ml：120mg：兽药字110803399
(6) 2.0ml:240mg：兽药字110803400

【生产企业】

浙江海正动物保健品有限公司

地址：浙江省杭州市富阳区东洲街道高尔夫路208号

电话：0571-23208916

传真：0571-23208915

网址：www.hisunah.com